

LA PREVALENCIA DEL CÀNCER, 2001

La Figura 1 mostra els 10 tumors amb prevalències més elevades per sexe (no es tenen en compte els tumors de pell no melanoma i els de llavi, tots dos amb unes supervivències properes al 100%). La Taula 1 mostra la prevalença de càncer, per sexe, el 31 de desembre de 2001 a la demarcació de Tarragona per a tipus tumorals seleccionats i per al conjunt de càncers sense els de pell no melanoma. El nombre de persones vives en aquella data a la demarcació de Tarragona que havien estat diagnosticades d'algun tipus de càncer en qualsevol moment de la seva vida s'estima en unes 15.000, és a dir, aproximadament un 2,5% de la població (taxa de 2.452 per 100.000 habitants).

Per sexes, les dones tenen una prevalença superior (8.157) que els homes (6.872) degut a que el conjunt de tumors més freqüents en les dones durant els 20 anys anteriors al 2001 (mama, budell gruixut i cos uterí), tenien unes supervivències superiors a les dels més freqüents en els homes (pulmó, còlon i recte, pròstata i bufeta urinària).

Globalment, el càncer més prevalent és el de mama (3.101), seguit del càncer de bufeta urinària (1.545), dels de còlon (1.331), pròstata (1.208), cos uterí (762) i recte i anus (701), del melanoma de pell (537), del limfoma no hodgkinià (531) i del càncer de coll uterí (450). Si es comptabilitzen els de còlon i recte juntament (budell gruixut) la seva prevalença se situa en segona posició (2.032).


Per sexes, en els homes es col·loquen en els primers llocs el de bufeta urinària (1.311), el de pròstata (1.208) i els de còlon i recte (1.096). En les do-

nes el de mama (3.101), els de còlon i recte (936) i el de cos uterí (762).

La prevalença no distingeix entre els pacients que estan curats o es curaran i els no curats. La prevalença de casos diagnosticats dintre dels cinc anys anteriors a la data de referència seria però una estimació dels casos que encara estan en procés de seguiment o de rehabilitació i que, per tant, encara estan requerint recursos sanitaris de forma més o menys periòdica. En el cas presentat, la prevalença amb diagnòstic de menys de cinc anys és de 6.637 casos (44,2% de la prevalença total). Per sexes els valors serien 3.620 (52,7% de la prevalença total en els homes) i 3.015 (37,0% de la prevalença total en les dones). El fet que mentre que la prevalença total era més elevada en les dones i en canvi la prevalença dels darrers cinc anys ho era més en els homes és degut a la major supervivència dels tumors més freqüents en les dones.

La prevalença és directament proporcional a la incidència i a la supervivència, i hi estan especialment representats els càncers de bon pronòstic i amb edats al diagnòstic inferiors. Així, per exemple, els melanomes de pell, que se situen en la tretzena i la desena posicions des de punt de vista de la incidència en els homes i dones respectivament, quant a la prevalença se situen en les posicions desena i quarta. En canvi, el càncer de pulmó que en els homes se situa en segona posició d'incidència, en relació a la prevalença se situa en la cinquena posició. Finalment, el pàncrees ocupa les posicions onzena i desena d'incidència en els homes i dones respectivament i les posicions vint-i-unena i la dissetena de prevalença.

Figura 1. Prevalença de càncer a 31 de desembre de 2001 de les localitzacions tumorals més freqüents per sexe



Taula 1. Prevalença de càncer per tipus tumoral i sexe, 31 de desembre de 2001

ICD10	TIPUS TUMORAL	Homes		Dones		Ambdós	
		Casos	Taxa	Casos	Taxa	Casos	Taxa
C01-06,09-13	Cavitat oral i faringe	243	79,5	58	19,0	302	49,2
C15	Esòfag	34	11,2	2	0,7	36	5,9
C16	Estómac	218	71,4	148	48,1	366	59,7
C18	Còlon	646	211,2	685	223,1	1.331	217,2
C19-21	Recte i anus	450	147,0	251	81,9	701	114,4
C22	Fetge	62	20,4	27	8,8	89	14,6
C23-24	Bufeta i vies biliars	29	9,4	38	12,3	66	10,8
C25	Pàncrees	23	7,7	33	10,8	57	9,2
C32	Laringe	364	118,8	12	4,0	376	61,3
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	378	123,4	54	17,7	432	70,5
C40-41	Os i cartílags	12	3,9	33	10,9	45	7,4
C43	Melanoma de pell	216	70,8	320	104,3	537	87,6
C47,49	Teixits tous i connectius	72	23,7	56	18,2	128	20,9
C50	Mama	-	-	3.101	1.010,1	-	-
C53	Coll uterí	-	-	450	146,7	-	-
C54	Cos uterí	-	-	762	248,2	-	-
C56	Ovari	-	-	241	78,5	-	-
C61	Pròstata	1208	394,8	-	-	-	-
C62	Testicle	119	39,1	-	-	-	-
C64	Ronyó	166	54,2	83	27,0	249	40,5
C67	Bufeta urinària	1311	428,6	234	76,1	1.545	252,0
C69	Ull	20	6,5	13	4,3	33	5,4
C70-72	Encèfal i SNC	85	27,7	91	29,5	175	28,6
C73	Tiroides	61	20,1	313	101,9	374	61,1
C81	Limfoma hodgkinià	139	45,5	84	27,2	223	36,3
C82-85,96	Limfoma no hodgkinià	273	89,1	259	84,3	531	86,7
C90	Mieloma múltiple	48	15,6	40	13,0	88	14,3
C91-95	Leucèmia	172	56,1	136	44,4	308	50,3
C00-96 (-C44)	Tots exc. pell no melanoma	6.872	2.246,1	8.157	2.656,8	15.029	2.451,8